

Informació sobre la vacuna d'Oxford-AstraZeneca

La vacuna de Oxford-AstraZeneca ha estat aprovada pel seu ús a l' Unió Europea el dia 29 de gener de 2021 i les primeres dosi arribaran a Catalunya el dia 8 de febrer.

Les vacunes aprovades per al seu ús a l' Unió Europea han complert els estrictes estàndards de seguretat, qualitat i efectivitat establerts per l'Agència Europea del Medicament, i que són similars a la de la resta de medicaments autoritzats.

Fins ara, més de 120 milions de persones han rebut vacunes contra la COVID-19 a nivell mundial.

Donada la limitació en la disponibilitat de dosi de vacunes, existeix un ordre de prioritització en l'aplicació de les vacunes, què es veu modificat per la incorporació de vacunes que van adreçades a diferents grups.

La aprovació de la vacuna d'Oxford-AstraZeneca possibilita avançar la vacunació de persones joves i adultes sanes que desenvolupen serveis essencials per a la societat.

Indicacions:

Prevenició de la COVID_19 en persones entre 18 i 55 anys excepte aquelles amb immunodepressió greu (incloent càncer en tractament quimioteràpic), malaltia cardiovascular no controlada i malaltia hepàtica, renal, metabòlica / endocrina o neurològica greus o aquelles amb antecedents d'al·lèrgia a algun component de la vacuna.

Els estudis realitzats fins ara amb aquesta vacuna incloïen sobre tot persones entre 18 i 55 anys sense malalties greus i per això a Espanya s'utilitzarà en aquestes edats i condicions fins que no es publiquin més dades en gent més gran i/o amb aquestes malalties.

Les persones de 56 i mes anys i les persones amb patologies cròniques greus o no controlades es vacunaran quan correspongui

Grups de població en que es començarà a utilitzar:

Tenint en compte la immediata disponibilitat de dosi, les indicacions de la vacuna i la situació epidemiològica actual, es començarà a vacunar a treballadors essencials especialment crítics.

Les persones treballadores que presten serveis en els sectors qualificats com a essencials, tenen major prioritat en la mesura que la funció social, la vida i el suport d'altres persones depenen directament d'elles i estaria en perill si emmalaltessin. Un servei o activitat essencial és aquell o aquella necessaris per al manteniment de les funcions socials bàsiques, la salut, la seguretat, el benestar social i econòmic dels ciutadans, o l'eficaç funcionament de les institucions de l'Estat i les Administracions Públiques.

S/Sistema de Salut de Catalunya

Són treballadors crítics els que no poden faltar i els que tenen que realitzar la seva tasca de forma presencial. Els col·lectius que no poden teletreballar (per exemple, Cossos i Forces de Seguretat, bombers, Protecció Civil, personal d'institucions penitenciàries) tenen una major probabilitat d'estar en entorns on el SARS-CoV-2 està circulant i estar exposats a una dosi infectiva del virus. Això provoca, a més, un major risc de transmetre la infecció a altres persones. A més, compten amb efectius limitats i difícilment reemplaçables.

Es començarà a vacunar per:

Serveis essencials especialment crítics.

1. Altres sanitaris i socio-sanitaris no inclosos en el grup 3 i personal d'institucions penitenciàries (IIPP). En aquest grup es vacunarà tot el personal sanitari i socio-sanitari no inclosos en els grups anteriors, així com a el personal d'Institucions Penitenciàries (IIPP). A més, es vacunarà el personal dels següents col·lectius que estiguin en actiu i amb treball presencial en contacte amb pacients: fisioterapeutes, personal de farmàcies comunitàries, protètics dentals, logopedes, psicòlegs clínics.

2. Cossos de Seguretat i Emergències.

Els altres serveis i professions essencials s'aniran considerant com a grups candidats per vacunació de manera progressiva, en funció de la disponibilitat de dosis de vacunes.

Administració:

La vacuna s'administra per via intramuscular en una pauta de 2 dosis (de 0,5 ml) separades entre 10 i 12 setmanes.

Important:

Les vacunes mai poden causar la malaltia.

L'efecte de la vacuna comença a aparèixer a partir de 22 dies després d'haver rebut la primera dosi.

La vacunació és una part més de l'estratègia de prevenció i control de la pandèmia causada per la COVID-19; una part fonamental, però, que ha de seguir acompanyada de les altres mesures. Mentre no s'aconsegueixin cobertures altes que proporcionin immunitat de grup, continuaran sent fonamentals les mesures de protecció conegudes (distanciament de seguretat, higiene de mans, ús de la mascareta, ventilació, limitació de la mobilitat, confinament domiciliari si hi ha símptomes) i les mesures de vigilància epidemiològica (cerca, testatge, rastreig).